



BULLETIN MENSUEL SUR LA SITUATION PHYTOSANITAIRE

Bulletin N° 44

Aout 2013

AUTORITE DE DEVELOPPPEMENT INTEGRE DE LA REGION DU LIPTAKO GOURMA (ALG)

SOMMAIRE

- . Situation phytosanitaire par région. Page 1
- . Situation du criquet pèlerin. Lire page 1
- . Situation des pesticides dans la région du Liptako- Gourma Page 2
- . Moyens utilisés Page 2
- . Difficultés rencontrées Page 2
- . Perspectives Page 2
- . Autres infos Page 2

Sur l'ensemble des trois pays, les importantes quantités de pluies enregistrées ont permis à la végétation annuelle de poursuivre son développement et aux pérennes de reverdir.

De manière générale, la physionomie de la campagne agricole, quoique hétérogène par les stades végétatifs, est satisfaisante.

Les états phytosanitaires dans leur ensemble ont été marqués par la présence des nuisibles des cultures à certains endroits.

Situation du Criquet Pèlerin

Au Burkina Faso (Situation non parvenue)

Mais selon la FAO, la situation demeure calme dans son ensemble.

Au Mali

Selon le Centre National de lutte contre le Criquet Pèlerin, la situation acridienne est restée calme sur l'ensemble du territoire.

Aucune signalisation ou observation de Criquet Pèlerin n'a été enregistrée durant tout le mois d'août.

En ce qui concerne le dispositif d'intervention mis en place, il est constitué de quatre (04) équipes de prospection/lutte. Ces équipes ont été placées dans les secteurs adjacents de l'aire grégarigène et à la lisière de la frontière mauritanienne. C'est ainsi deux (02) équipes ont positionnées dans la Région de Mopti (Koro et Sévaré), une (01) dans la Région e Kayes (Yélimané), une (01) dans la Région de Koulikoro (Nara).

Au Niger

Au cours de ce mois, avec les conditions écologiques favorables constatées, dans toutes les aires de reproduction et de grégarisation, il a été révélé la présence d'individus matures solitaires isolés dans le Sahel des pâturages et le Tamesna ; des ailés immatures souvent groupés et matures isolés dans l'Est Aïr.

Des traitements de superficies localisées ont été effectués dans l'Est Aïr.

Le dispositif de surveillance mis en place est de quatre (04) équipes dont deux (02) de lutte dans l'Est Aïr, une (01) de prospection dans le Tamesna, et une (01) de prospection également dans le sahel des pâturages (Nord Tillabéry)■

Situation phytosanitaire

Avec la régularité des précipitations et les stades végétatifs des principales cultures céréalières observés, on assiste à une situation phytosanitaire qui est marquée par des infestations d'acridiens, de cantharides, de pucerons, de cicadelles, des punaises etc.

Au Burkina Faso (Situation non parvenue)

Au Mali, (Situation non parvenue)

Au Niger, d'une manière générale, la situation se présente comme suit :

- fin des interventions aériennes contre les oiseaux granivores et les cicadelles dans la région de Tahoua ;
- début d'apparition de la mineuse de l'épi du mil dans les départements de Guidan Roumdji, Aguié, Madarounfa, Tahoua, Madaoua et Illéla ;
- début des lâchers Habrobracon hebetor parasitoïde de la mineuse de l'épi de mil dans les départements de Guidan Roumdji et Aguié ;
- nouvelles éclosions de sautériaux dans les départements de Diffa, Mainé-Soroa, Dakoro, Mayahi, Tillabéri, Ouallam, Tchintabaraden, Malbaza, Illéla , Gotheye, Belbédji et Tanout;
- attaques d'insectes floricoles sur le mil dans les départements de Dosso, Falmey, Doutchi, Loga, Boboye, Madaounfa, Aguié, Gazaoua, la communauté urbaine de Maradi, Téra et Say ;
- persistance des attaques du Criocère du mil dans les départements de Madarounfa, Aguié et Gazaoua;
- nouvelles signalisations d'oiseaux granivores dans les départements de Tillabéri, Balléyara, Ayorou;
- attaques de foreurs des tiges de mil dans les départements de Téra, Tillabéri et Torodi ;
- présence des pucerons et chenilles poilues sur les légumineuses dans les départements de Takiéta, Duungass, Madarounfa, Aguié et Gazaoua ■

Situation des pesticides

Au Burkina Faso (Situation non parvenue)

Au Mali

En fin du mois d'août, le stock national de pesticide était de 32 000 litres de Chlorpyrifos 240g/l.

Au Niger

En fin du mois d'août le Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA) disposait d'un stock de pesticide de 32 685 litres de pesticide synthèse. Quant à la Direction Générale de la Protection des Végétaux, elle possédait également 49 411 litres de pesticides repartis dans ses magasins régionaux et départementaux.

Moyens utilisés

Au Burkina Faso (Situation non parvenue)

Au Mali (Situation non parvenue)

Au Niger

Dans toutes les zones ayant fait l'objet d'attaques, les interventions ont été menées soit par voie terrestre soit par voie aérienne.

Le cumul des superficies traitées en fin août s'élevait à 20 273 ha contre 34 792 ha infestés soit un taux de couverture de 58, 26%

Difficultés rencontrées

(Situation non parvenue)

Perspectives

En ces moments décisifs de la campagne agricole la surveillance doit être renforcée en vue de prévenir les attaques de tout genre en ce qui concerne les nuisibles des cultures.

Aussi, les zones sensibles aux acridiens (aires grégarigènes tels que les Oueds de l'Adrar des Iforas, au Mali et le versant occidental des montagnes de l'Air d'Iférouane au Niger) devront faire l'objet de surveillance accrue.

Autres informations

Au Niger, au cours du mois, le Centre National de lutte Antiacridienne a bénéficié de la visite de Monsieur le Ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture.